

# Tasectan® | AF

## DK Anvendelse

Tasectan AF gendanner de fysiologiske funktioner i tarmvæggene og er specifikt formuleret til at kontrollere og reducere symptomer relateret til diarré af forskellige årsager, såsom abdominal spænding og hyppig afføring. Tasectan AF virker ved at danne en film, der beskytter tarmslimhinden, hvilket reducerer hyppigheden og varigheden af diarréepisoder.

## Pakninger

8 breve med pulver til børn, neutral smag.

Blisterpakning med 8 kapsler til voksne.

## Ingredienser:

Pulver med neutral smag til børn: Xyloglucan, Gelose, Siliciumdioxid.

Kapsler: Xyloglucan, Gelose, Magnesiumstearat (vegetabilsk oprindelse), Siliciumdioxid

## Brugsanvisning

Pulver med neutral smag til børn: Bland indholdet af et brev med en lille mængde vand, og giv det straks. Pulveret må ikke gives uden først at blande det med vand.

Kapsler: Synkes med væske

## Dosering

Børn under 3 år: 1 brev hver 8. time.

Børn over 3 år: 1-2 breve hver 6-8 time.

Voksne: 1-2 kapsler hver 6-8 time.

## Advarsler

- Det er ikke nødvendigt at konsultere en sundhedsfaglig person, før du anvender Tasectan AF. Det anbefales dog at konsultere lægen eller anden sundhedsfaglig person i tilfælde af alvorlige eller vedvarende symptomer, eller ved tvivl om diagnosen.
- Det anbefales at konsultere en læge eller anden sundhedsfaglig person i tilfælde af diarré hos børn under 3 år og hos ældre, særligt hvis andre symptomer er til stede.
- Tasectan AF er ikke en farmakologisk behandling. Hvis en sådan behandling anbefales af lægen eller anden sundhedsfaglig person, kan Tasectan AF tages samtidig.
- Det anbefales at indtage rigelig væske og at følge de sædvanlige kostanbefalinger, der anvendes i forbindelse med diarré.
- Selvom der ikke kendes til bivirkninger for Tasectan AF, anbefales det, at produktet ikke anvendes under graviditet eller ved amning, medmindre din læge eller anden sundhedsfaglig person har angivet andet.
- Brug ikke produktet efter den udløbsdato, der er trykt på pakken.
- Brug ikke produktet, hvis blisterpakningen eller brevene er åbne eller er beskadiget.
- Tasectan AF kræver ingen særlige opbevaringsforhold. Må ikke fryses.
- Tasectan AF skal opbevares utilgængeligt for børn.

## Kontraindikationer

Tag ikke Tasectan AF, hvis du er allergisk over for nogle af indholdsstofferne – som er angivet under Ingredienser

## FI Käyttötarkoitus

Tasectan AF on tarkoitettu palauttamaan suolen seinämien fysiologiset toiminnot, erityisesti eri systä johtuvan ripulin aiheuttaman vatsan jännityksen ja runsaan ulostamisen kontrolloimiseksi ja vähentämiseksi. Tasectan AF -tuotteen ainesosat muodostavat suoliston limakalvoa suojaavan kalvon, joka vähentää ripulin esiintymistä ja kestoa.

## Tuotemuodot

Kahdeksan tai kaksitoista annospussia, jotka sisältävät makuaineetonta jauhetta lapsille.

Läpипainopakkaus, joka sisältää kahdeksan kapselia aikuisille.

## Ainesosat

Jauhe lapsille ilman makua: ksyloglukaani, geloosi (kasvigelatiini), piidioksidi.

Kapselit: ksyloglukaani, geloosi (kasvigelatiini), magnesiumstearaatti (kasviperäinen), piidioksidi.

## Käyttöohjeet

Jauhe lapsille: sekoita yhden annospussin sisältö pieneen määrään vettä ja anna heti. Älä anna tuotetta suoraan sekoittamatta sitä ensin veteen.

Kapselit: niele kapseli nesteen kanssa.

## Annostus

Alle 3-vuotiaat lapset: 1 annospussi 8 tunnin välein.

Yli 3-vuotiaat lapset: 1 - 2 annospussia 6 - 8 tunnin välein.

Aikuiset: 1 - 2 kapselia tai kapselia 6 - 8 tunnin välein.

## Varoitukset

- Ennen tuotteen käyttöä ei ole tarpeen konsultoida terveydenhuollon ammattilaista. Tämä on kuitenkin suositeltavaa, jos ilmenee vakavia tai pysyviä oireita tai jos epäilet diagnoosia.

- Alle 3-vuotiaiden ja iäkkäiden tapauksessa on suositeltavaa neuvotella terveydenhuollon ammattilaisen kanssa, varsinkin jos ripuliin liittyy muita oireita.
- Tämä terveydenhuollon laite ei ole farmakologinen hoito. Jos terveydenhuollon ammattilainen suosittelee farmakologista hoitoa, tuotetta voidaan antaa samanaikaisesti sen kanssa.
- Ripulin hoidossa suositellaan runsasta nesteen nauttimista ja ruokavaliotoimenpiteitä.
- Vaikka häittäväkautuksia ei tunneta, tuotetta ei suositella käytettäväksi raskauden tai imetyksen aikana, ellei terveydenhuollon ammattilainen toisin arvioi.
- Älä käytä tuotetta pakkaukseen merkityn viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen.
- Älä käytä tuotetta, jos läpipainopakkaus tai pussit ovat auki tai vahingoittuneita.
- Tuote ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita. Ei saa jäätyä.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.

## Vasta-aiheet

Ei tule käyttää potilaille, joilla tiedetään olevan yliherkkyys koostumuksessa luetelluille tuotteen ainesosille.

## SE Användning

Tasectan AF är avsedd att återställa de fysiologiska funktionerna i tarmväggarna, särskilt formulerad för att kontrollera och reducera symptom relaterade till diarré av olika typer, såsom bukspänningar och frekvent avföring. Tasectan AF verkar genom att bilda en film som skyddar tarmslemhinnan, vilket minskar diarréns frekvens och varaktighet.

## Förpackningstyper

8 dospåsar som innehåller pulver utan smak, för barn.

8 kapslar i blisterförpackning, för vuxna.

## Innehåll

Pulver utan smak, för barn: Xyloglukan, Gelos, Kiseldioxid

Kapslar: Xyloglukan, Gelos, Magnesiumstearat (vegetabiliskt ursprung), Kiseldioxid

## Bruksanvisning

Pulver utan smak, för barn: lös upp innehållet från en dospåse med en liten mängd vätska och ge omedelbart. Administrera inte produkten direkt utan att blanda den.

Kapslar: svälj kapslarna med vätska.

## Dosering

Barn under 3 år: 1 dospåse var 8:e timme.

Barn över 3 år: 1–2 dospåsar var 6–8 timme.

Vuxna: 1–2 kapslar var 6–8 timme.

## Varningar

- Hälso- eller sjukvårdspersonal behöver inte rådfrågas före användning av produkten. Vid allvarliga eller ihållande symptom eller om det finns tvivel om diagnosen rekommenderas dock att hälso- eller sjukvårdspersonal rådfrågas.
- Vid diarré hos barn under 3 år och äldre personer rekommenderas samråd med vårdpersonal, särskilt när andra symptom förekommer.
- Tasectan AF är inte en läkemedelsbehandling. Om läkemedelsbehandling rekommenderas av hälso- eller sjukvårdspersonal kan denna produkt användas samtidigt.
- Ett rikligt vätskeintag och kostråd som gäller vid hantering av diarré rekommenderas.
- Även om inga biverkningar är kända rekommenderas det att produkten inte används under graviditet eller amning, om inte annat anges av sjukvårdspersonal.
- Använd inte produkten efter det utgångsdatum som anges på förpackningen.
- Använd inte produkten om blisterförpackningen eller dospåsen är öppen eller skadad.
- Tasectan AF kräver inga speciella lagringsförhållanden. Får ej frysas.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn.

## Kontraindikationer

Tasectan AF ska inte användas till patienter med känd överkänslighet mot någon ingrediens i produkten som anges under innehåll.



Glutenfri  
Gluteeniton  
Glutenfri



Laktosefri  
Laktoositon  
Lactosfri



Velegnet til veganere  
Vegaaneille sopiva  
Lämplig för veganer

Rev. 07c08-11-25-29: 01.08.2024

Markkinointi/Marknadsförare Finland:

Sabora Pharma Oy  
P.O. Box 20  
FI-03601 Karkkila, Finland  
Puh/tel: 029 3700 350  
www.sabora.fi

Distributør/Distributör Danmark og/och Sverige:

Pharmaforce ApS  
Frederiksborggade 15, 3. sal  
DK-1360 København K., Danmark  
Tlf/tel: +45 70272747  
www.pharmaforce.dk



NOVENTURE, S.L.  
Avenida Diagonal, 549, 5ª planta  
08029 Barcelona, España